



HER 30 SANİYEDE, 1 DİYABET HASTASI AYAĞINI KAYBEDİYOR.¹



Nedenini biliyor musunuz ?


Diyabetik Periferik Nöropati (DPN) Nedir?

- Dünya çapında diyabet ve prediyabet yükündeki artışın, önümüzdeki yıllarda diyabetik periferik nöropati gibi kronik diyabetle ilişkili komplikasyonların artan yaygınlığı şeklinde de kendini göstermesi bekleniyor .
- Diyabetik periferik nöropati, hem tip 1 diyabetin (T1D) hem de tip 2 diyabetin (T2D) en yaygın ve sorunlu komplikasyonlarından biriyken, prediyabetli hastalarda da diyabetik periferik nöropati gelişebilir.
- En yaygın diyabetik periferik nöropati, distal simetrik polinöropatidir (tipik diyabetik periferik nöropati olarak da bilinir) ve diyabetik periferik nöropati (DPN) olarak adlandırılır.
- Diyabetik Periferik Nöropati, nöropatik ağrıyla birlikte veya olmadan, distal duyuşal veya motor fonksiyon kaybının karakteristik eldiven ve çorap benzeri sunumu da dahil olmak üzere periferik sinirlere verilen hasarı ifade eder.




DPN kaç hastayı etkiler?

- Tedavi edilmeyen DPN'nin hasta morbiditesi ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkileri vardır. (Uzuv duyusunun kaybı, düşmeler, ayak ülseri ve alt uzuv amputasyonlarının artmış riski).
- DPN'li diyabetik hastalar ayrıca DPN'siz olanlara göre tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler mortalite açısından daha yüksek risk altındadır.



DPN, Tip 1 DM ve
Tip 2 DM hastalarının

%50 'sine
kadarını



ve prediyabetik
hastaların en az

%10 kadarını
etkiler